




Evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI)

în sezonul 2025-2026


Săptămâna 02.02.2026- 08.02.2026 (S 06/2026)

➤ În săptămâna 02.02.2026 - 08.02.2026 (S 06/2026) au fost raportate:

- **106.462 cazuri de infecții respiratorii** (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 5.7% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (**112.896**) și cu 32.8% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (**158.395**). Variația în minus față de media calculată de **125.660** a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 15.3%.




- **6.780 cazuri de gripă clinică** la nivel național, comparativ cu **9.039** înregistrate în săptămâna precedentă și cu **11.760** în aceeași săptămână a sezonului precedent și de 1.3 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (**5.094**).





- Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (682) și în județele Cluj (597) și Prahova (591).



- **50 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI)**, cu 10 mai puține față de săptămâna precedentă și cu 33 mai puține față de aceeași perioadă a sezonului precedent.
 - **175 cazuri de gripă confirmată de laborator** (45 cu virus gripal AH3, 12 cu virus gripal AH1 și 118 cu virus gripal A nesubtipat).
 - **De la începutul sezonului au fost raportate:**
 - 1.619 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:**
 - ✓ 473 cu virus gripal AH3
 - ✓ 84 cu virus gripal AH1
 - ✓ 1.055 cazuri cu virus gripal A nesubtipat
 - ✓ 6 cazuri cu virus gripal B
 - ✓ 1 caz cu co-infecție de virus gripal A+B
- La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată **subclada K**.
- **Au fost comunicate 6 decese noi confirmate cu virus gripal.**

Până în prezent au fost comunicate **74 decese confirmate cu virus gripal**:

 - ✓ 10 tip A, subtip H1;
 - ✓ 28 tip A, subtip H3;
 - ✓ 35 tip A
 - ✓ 1 co-infecție tip A, subtip H3+B

Cele **74 decese** au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

 - ✓ 1 la 5-14 ani;
 - ✓ 5 la 15-49 ani;
 - ✓ 7 la 50-64 ani;
 - ✓ 61 la ≥65 ani
 - Până la data de **08.02.2026** au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de **1.303.355** de vaccinări antigripale (**1.276.476** fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care **6.096** vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.



Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Cazuri coinfectie tip A și tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	0	0	17	1	0	18	0
Arad	17	113	1	0	0	131	3
Arges	0	0	3	0	0	3	0
Bacau	0	1	1	0	0	2	0
Bihor	2	18	0	0	0	20	1
Bistrita	0	0	59	1	0	60	1
Botosani	0	0	1	0	0	1	0
Brasov	0	1	67	0	0	68	0
Braila	0	1	4	0	0	5	1
Buzau	15	9	6	0	0	30	14
Caras	0	0	1	0	0	1	1
Calarasi	0	8	11	0	0	19	0
Cluj	3	67	36	0	0	106	11
Constanta	3	22	91	3	1	120	7
Covasna	0	0	0	0	0	0	0
Dambovita	3	0	11	0	0	14	0
Dolj	0	0	0	0	0	0	0
Galati	4	34	8	0	0	46	0
Giurgiu	0	3	2	0	0	5	0
Gorj	0	1	1	0	0	2	0
Harghita	0	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0	1	0	0	0	1	0
Ialomita	0	0	23	0	0	23	1
Iasi	2	26	27	0	0	55	0
Maramures	0	13	31	0	0	44	2
Mehedinti	0	0	1	0	0	1	0
Mures	0	27	29	0	0	56	1
Neamt	0	0	0	0	0	0	0
Olt	11	8	1	0	0	20	4
Prahova	0	1	11	0	0	12	3
Satu Mare	0	6	235	0	0	241	9
Salaj	0	0	0	0	0	0	0
Sibiu	2	3	136	0	0	141	6
Suceava	0	6	0	0	0	6	0
Teleorman	0	0	5	0	0	5	1
Timis	0	5	3	0	0	8	1
Tulcea	0	0	3	0	0	3	1
Vaslui	0	1	1	0	0	2	0
Valcea	0	0	21	0	0	21	0
Vrancea	0	0	0	0	0	0	0
Bucuresti	21	88	160	1	0	270	5
Ilfov	1	10	48	0	0	59	1
Total	84	473	1055	6	1	1619	74



În contextul epidemiologic menționat, **INSP-CNSCBT** face următoarele **recomandări de sănătate publică**:

- Persoanele eligibile pentru **vaccinare**, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.
- **Tratarea timpurie** a persoanelor afectate cu **antivirale antigripale** este esențială pentru a reduce probabilitatea complicațiilor și a progresiei bolii la populațiile cu risc crescut de boală severă.
- **Profilaxia antivirală** ar trebui luată în considerare în focarele detectate în **centrele de îngrijire pe termen lung** (LTCF), indiferent de statusul vaccinal.
- Personalul și vizitatorii ar trebui să utilizeze **măști în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung**, în perioadele de circulație crescută a virusurilor respiratorii.
- **Comunicarea către populație** este deosebit de importantă, cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea și impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind **vaccinarea, respectarea igienei mâinilor și respectarea etichetei respiratorii**.
- Rezultatele **supravegherii epidemiologice și virologice** se raportează în continuare, săptămânal, de către CNSCBT, prin intermediul platformei europene EpiPulse, pentru a sprijini evaluarea și răspunsul rapid în UE/SEE.

Măsurile recomandate pentru prevenirea gripei, cât și beneficiile ale vaccinării pot fi regăsite pe site-ul INSP, la următoarele link-uri:

Recomandări pentru populație în contextul intensificării circulației virusului gripal A(H3N2), subclada K și al debutului sezonului gripal în România:

<https://insp.gov.ro/2025/12/12/recomandari-pentru-populatie-in-contextul-intensificarii-circulatiei-virusului-gripal-ah3n2-subclada-k-si-al-debutului-sezonului-gripal-in-romania/>

Măsurile recomandate pentru prevenirea gripei:

<https://insp.gov.ro/masuri-recomandate-pentru-prevenirea-gripei/>

Beneficiile vaccinării:

<https://insp.gov.ro/2025/10/21/beneficiile-vaccinarii-antigripale/>